



## Hinweise für Männer und Frauen

Lesen Sie sorgfältig die Packungsbeilage durch, bevor Sie mit der Behandlung beginnen. Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Einnahme von Roaccutan haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker bzw. an Ihre Ärztin oder Apothekerin.

Dieses Medikament wurde nur Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es unter keinen Umständen an andere Personen weiter und geben Sie alle nicht eingenommenen Kapseln in der Apotheke zurück.

Während der Roaccutan-Therapie und einen Monat lang nach Absetzen der Therapie darf aufgrund des potenziellen Risikos für das ungeborene Kind einer schwangeren Transfusionsempfängerin kein Blut gespendet werden.

## Spezielle Hinweise für Frauen

Roaccutan darf nicht während einer Schwangerschaft und Stillzeit eingenommen werden, da der Wirkstoff in die Muttermilch gelangen kann.

Roaccutan kann schwerwiegende Schädigungen des ungeborenen Kindes verursachen, wenn es während einer Schwangerschaft eingenommen wird.

Wenn Sie schwanger werden wollen oder glauben, schwanger zu sein, beenden Sie die Einnahme von Roaccutan sofort und wenden Sie sich an Ihren Arzt/Ihre Ärztin.

# Was Sie tun müssen, wenn Sie schwanger werden könnten:

! Sie müssen vor, während und 1 Monat lang nach Beendigung der Behandlung mindestens 1 hochwirksame Methode zur Empfängnisverhütung (z.B. eine Spirale oder ein Implantat) oder 2 wirksame Methoden zur Empfängnisverhütung anwenden, die auf verschiedene Weise wirken (z. B. die Pille zusammen mit einem Kondom). Sie dürfen während der Einnahme von Roaccutan und 1 Monat lang nach Beendigung der Behandlung nicht schwanger werden.

! Sie müssen regelmässige Folgeuntersuchungstermine einhalten und regelmässige Schwangerschaftstests durchführen:

- Bevor Sie mit der Behandlung beginnen, müssen Sie einen ärztlich beaufsichtigten Schwangerschaftstest durchführen, der negativ sein muss.
- Um sicherzustellen, dass Sie während der Behandlung nicht schwanger sind, müssen Sie regelmässig Schwangerschaftstests durchführen (jeden Monat). Sie müssen auch 5 Wochen nach Beendigung der Behandlung einen letzten Schwangerschaftstest durchführen.

Lesen Sie die Packungsbeilage für weitere Informationen (unter [www.swissmedicinfo.ch](http://www.swissmedicinfo.ch)).

### HINWEISE zur Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, das medizinische Fachpersonal oder Ihren Apotheker. Das gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Broschüre bzw. der Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch über [medinfo@cheplapharm.ch](mailto:medinfo@cheplapharm.ch) melden.

## Patientenpass

Name des Patienten/der Patientin:

.....  
.....  
.....  
.....

Telefon:

.....  
.....

Notizen:

.....  
.....  
.....