

Calendrier des visites

Veillez noter vos rendez-vous chez votre médecin dans ce tableau.

Nom du médecin:

.....
.....
.....
.....

Téléphone:

.....
.....

Notes:

.....
.....
.....
.....
.....

Date du rendez-vous	Contraceptifs utilisés	Résultat du test de grossesse	Signature du médecin
		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif Date:	
		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif Date:	
		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif Date:	
		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif Date:	
		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif Date:	
		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif Date:	
		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif Date:	
		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif Date:	



Carte-patient pour Roaccutan® (Isotrétinoïne)

07/2024

Cette carte et l'information destinée aux patients renferment d'importants renseignements de sécurité concernant votre traitement par Roaccutan. Veuillez en prendre connaissance avant le début du traitement. Gardez toujours cette carte sur vous et présentez-la chez tous les médecins.

Remarques pour les hommes et les femmes

Lisez attentivement la notice du médicament avant de débuter le traitement.

Si vous avez des questions ou des doutes concernant la prise de Roaccutan, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le remettez en aucun cas à d'autres personnes, et rapportez toutes les capsules non prises à la pharmacie.

Ne donnez pas de sang pendant le traitement ni dans le mois qui suit la fin du traitement par Roaccutan en raison du risque encouru par le fœtus si la receveuse est enceinte.

Remarques pour les femmes

Roaccutan ne doit en aucun cas être pris pendant la grossesse ou l'allaitement étant donné que l'actif peut passer dans le lait maternel.

Roaccutan est susceptible de provoquer des lésions graves chez l'enfant à naître s'il est pris au cours de la grossesse.

Si vous prévoyez une grossesse ou pensez être déjà enceinte, arrêtez immédiatement le traitement par Roaccutan et consultez votre médecin.

Ce que vous devez faire si vous pouvez tomber enceinte:

- ! Vous devez utiliser au minimum une méthode contraceptive hautement efficace (p. ex. stérilet ou implant) ou alors deux méthodes contraceptives fiables dont le mode d'action est différent (p. ex. un contraceptif oral avec un préservatif) avant le début du traitement et pendant toute la durée de celui-ci, puis encore un mois après la fin du traitement. Vous ne devez pas tomber enceinte pendant que vous prenez Roaccutan ni dans le mois qui suit l'arrêt du traitement.

- ! Honorez tous vos rendez-vous de suivi et faites régulièrement les tests de grossesse:

- Un test de grossesse sous surveillance médicale avant de commencer le traitement – dont le résultat doit être négatif.
- Un test de grossesse chaque mois pour vérifier que vous n'êtes pas enceinte pendant le traitement. Un dernier test de grossesse est prévu 5 semaines après la fin du traitement.

Pour de plus amples informations, lisez la notice du médicament (sur www.swissmedicinfo.ch).

CONSIGNES pour le signalement d'effets secondaires

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, un professionnel de la santé ou votre pharmacien. Cela vaut également pour les effets secondaires non mentionnés dans cette brochure ou la notice de l'emballage.

En signalant des effets secondaires, vous pouvez contribuer à améliorer les connaissances sur la tolérabilité et l'utilisation de médicaments. Vous pouvez également signaler des effets secondaires en écrivant à medinfo@cheplapharm.ch.

Carte-patient

Nom du/de la patient(e):

.....
.....
.....
.....

Téléphone:

.....
.....

Notes:

.....
.....
.....