

Megjegyzés:

Előjegyzési napló

Kérjük, hogy ezt a táblázatot az orvosi
ellenőrző vizsgálatok időpontjának
feljegyzésére használja:

Ellenőrző vizsgálat időpontja	Alkalmazott fogamzásgátló módszer

Terhességi teszt eredménye	Kezelőorvos aláírása
☐ Pozitív ☐ Negatív Dátum:	
☐ Pozitív ☐ Negatív Dátum:	
☐ Pozitív ☐ Negatív Dátum:	
☐ Pozitív ☐ Negatív Dátum:	
☐ Pozitív ☐ Negatív Dátum:	
☐ Pozitív ☐ Negatív Dátum:	
☐ Pozitív ☐ Negatív Dátum:	
☐ Pozitív ☐ Negatív Dátum:	
☐ Pozitív ☐ Negatív Dátum:	



Beteg emlékeztető kártya Roaccutan® (izotretinoin)

Kérjük, hogy bármely gyógyszerrel kapcsolatos feltételezett mellékhatást jelentsen a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak (NNGYK) a www.ogyei.gov.hu honlapon megtalálható online bejelentő-felületen keresztül (<https://mellekhatas.ogyei.gov.hu/>), vagy a honlapról letölthető mellékhatás-bejelentő lapon, melyet visszaküldhet e-mailben (adr.box@nngyk.gov.hu), vagy levélben (NNGYK, 1372 Budapest, Pf. 450.).

A feltételezett mellékhatásokat a forgalomba hozatali engedély jogosult szolgáltatójának is jelentheti az alábbi elérhetőségeken:

RADAYDRUG Kft. tel.: +36 30 699 55 70, email: pharmacovigilance@radaydrug.com

Forgalomba hozatali engedély jogosult:
CHEPLAPHARM Registration GmbH, Weiler Straße 5c,
79540 Lörrach, Németország

Kérjük, hogy mellékhatás-bejelentését csak az egyik helyre juttassa el!

Roaccutan®
Izotretinoin

Az izotretinoint terhesség alatt tilos alkalmazni.

Terhesség alatt alkalmazva az izotretinoin súlyosan károsíthatja a magzatot.

Ha Ön terhes vagy úgy gondolja, hogy terhes lehet, azonnal hagyja abba a gyógyszer alkalmazását és forduljon kezelőorvosához.

Mielőtt elkezdik Önnél a kezelést, olvassa el figyelmesen a betegájékoztatót.

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van az izotretinoin alkalmazásával kapcsolatban, forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez

Mit kell tennie, ha Önnél fennáll a teherbeesés lehetősége?

! Önnnek legalább egy, rendkívül hatékony fogamzásgátló módszert (például méhen belüli eszközt vagy implantátumot), vagy két hatásos, eltérő hatásmechanizmusú fogamzásgátló módszert (például egy hormonális fogamzásgátló tablettát és óvszert) kell alkalmaznia a kezelés megkezdése előtt, a kezelés során, továbbá a kezelés befejezése után még 1 hónapig.

! Ön nem eshet teherbe a kezelés alatt és még 1 hónapig a kezelés befejezése után.

! Önnnek rendszeresen meg kell jelennie a kontroll vizsgálatokon és rendszeresen terhességi tesztet kell végeznie:

- A kezelés megkezdése előtt Önnél terhességi tesztet kell végezni, melynek eredménye negatív kell, hogy legyen.
- A kezelés alatt a terhesség kizárása érdekében rendszeres terhességi teszt elvégzésére van szükség, ideális esetben havonta. 1 hónappal a kezelés befejezését követően még egy utolsó terhességi tesztet kell végezni.

Figyelmeztetés férfiaknak és nőknek

Ezt a gyógyszert kizárólag Önnnek írták fel, **ne adja át másnak, és a kezelés végén a fel nem használt kapszulákat juttassa vissza a gyógyszertárba.**

Beteg emlékeztető Kártya

Kezelőorvos neve:

Telefonszám:

Megjegyzés: